

**FUNED Donepezila**  
**cloridrato de donepezila**

**I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO**

**Nome comercial:** FUNED Donepezila

**Nome do princípio ativo:** cloridrato de donepezila

**APRESENTAÇÕES**

- FUNED Donepezila 5 mg é apresentado em embalagens contendo 28 ou 30 comprimidos revestidos, além das embalagens hospitalares contendo 200, 250 ou 500 comprimidos revestidos.
- FUNED Donepezila 10 mg é apresentado em embalagens contendo 28 ou 30 comprimidos revestidos, além das embalagens hospitalares contendo 200, 250 ou 500 comprimidos revestidos.

**USO ORAL**

**USO ADULTO**

**COMPOSIÇÃO**

Cada comprimido revestido contém:

cloridrato de donepezila ..... 5 mg (equivalente a 4,56 mg de donepezila)

Excipientes ..... q.s.p. 1 comprimido  
(amido pré-gelatinizado, celulose microcristalina, hiprolose, lactose, estearato de magnésio, hipromelose, macrogol, dióxido de titânio).

cloridrato de donepezila ..... 10 mg (equivalente a 9,12 mg de donepezila)

Excipientes ..... q.s.p. 1 comprimido  
(amido pré-gelatinizado, celulose microcristalina, hiprolose, lactose, estearato de magnésio, hipromelose, macrogol, dióxido de titânio, óxido de ferro amarelo).

## II - INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

FUNED Donepezila é um medicamento indicado para o tratamento da doença de Alzheimer.

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Acredita-se que FUNED Donepezila exerça sua ação terapêutica com o aumento da concentração da acetilcolina (substância presente na junção entre células do sistema nervoso) por meio da inibição reversível da quebra dessa substância pela enzima acetilcolinesterase (tipo de enzima que quebra ou inativa a acetilcolina).

O tempo estimado para o início da ação farmacológica de FUNED Donepezila é de cerca de 2 semanas após a administração oral, quando é esperado que a concentração plasmática (sanguínea) de FUNED Donepezila alcance o estado de equilíbrio.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não utilize FUNED Donepezila se tiver conhecimento de hipersensibilidade ao cloridrato de donepezila, aos derivados de piperidina ou a qualquer componente da formulação.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

#### **Advertências e Precauções**

**Anestesia:** informe ao seu médico o uso de FUNED Donepezila, pois este medicamento é um inibidor da colinesterase (classe medicamentosa de FUNED Donepezila) e pode aumentar o relaxamento muscular de alguns anestésicos.

**Condições cardiovasculares:** foram relatados episódios de desmaio durante o uso de FUNED Donepezila devido a efeitos cardíacos (por exemplo, diminuição da frequência cardíaca), principalmente para alguns pacientes com problemas cardíacos.

**Condições gastrointestinais:** medicamentos da mesma classe de FUNED Donepezila, os chamados colinomiméticos (substâncias que imitam os efeitos da acetilcolina no organismo), podem promover o aumento da secreção ácida gástrica (quantidade de ácido liberado no estômago). Portanto, os pacientes devem ser cuidadosamente monitorados quanto a sintomas de sangramento gastrointestinal (no estômago e intestino), especialmente aqueles com maior risco de desenvolver úlceras (feridas) (p.ex., pacientes com história de doença ulcerosa ou recebendo drogas anti-inflamatórias não esteroides). Pode ocorrer diarreia, náusea e vômito. Esses efeitos, quando ocorrem, aparecem com mais frequência na dose de 10 mg/dia do que na dose de 5 mg/dia. Na maioria dos casos, esses efeitos têm sido leves e transitórios, algumas vezes durando de 1 a 3 semanas, e têm se resolvido com o uso continuado de FUNED Donepezila. Os pacientes devem ser cuidadosamente observados no início do tratamento e após o aumento da dose.

**Condições neurológicas:** acredita-se que os colinomiméticos tenham certo potencial para causar convulsões generalizadas. Entretanto, tal situação pode ser também uma manifestação da doença de Alzheimer.

Síndrome neuroléptica maligna é um evento adverso muito raro que se caracteriza por tremores, febre alta e alteração no nível de consciência que se não tratado adequadamente pode levar à morte.

Rabdomiólise é um evento raro que pode se manifestar em pacientes com predisposição individual e que estejam ou não em uso de outros medicamentos que sabidamente causam este efeito com maior frequência, como as estatinas (medicamento para tratamento de colesterol) e medicamentos com ação no sistema nervoso. Caso você sinta dores generalizadas, apresente escurecimento da urina, fraqueza e mal estar com o uso de FUNED Donepezila, procure seu médico.

**Condições pulmonares:** devido a suas ações colinomiméticas, FUNED Donepezila deve ser prescrito com cuidado a pacientes com história de asma ou doença pulmonar obstrutiva (por exemplo: enfisema pulmonar causado pelo vício do cigarro).

**Crianças:** não existem estudos adequados e bem controlados para documentar a segurança e a eficácia de FUNED Donepezila em qualquer tipo de doença que ocorra em crianças.

**Este medicamento pode causar *doping*.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Atenção:** Este medicamento contém corantes que podem, eventualmente, causar reações alérgicas.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se ocorrer gravidez ou iniciar amamentação durante o uso deste medicamento.**

#### **Interações medicamentosas**

Deve-se evitar a administração de FUNED Donepezila concomitantemente a outros inibidores da colinesterase.

O itraconazol, o cetoconazol, a eritromicina, a fluoxetina e a quinidina podem inibir o metabolismo da donepezila.

A rifampicina, a fenitoína, a carbamazepina e o álcool podem reduzir os níveis de donepezila. FUNED Donepezila tem potencial para interferir com medicamentos de ação anticolinérgica, bloqueadores neuromusculares, agonistas colinérgicos e betabloqueadores.

Não tome álcool enquanto estiver usando FUNED Donepezila, você pode ter várias reações indesejáveis.

A ingestão concomitante com alimento não tem influência sobre a taxa e a quantidade absorvida de FUNED Donepezila.

**Durante o tratamento, o paciente não deve dirigir veículos ou operar máquinas, pois sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

#### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

FUNED Donepezila deve ser conservado em temperatura ambiente (15 °C a 30 °C).

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

#### **Características físicas e organolépticas**

– Os comprimidos de FUNED Donepezila 5 mg são brancos, biconvexos, revestidos, sulcados, medindo 6,5 mm de diâmetro.

- Os comprimidos de FUNED Donepezila 10 mg são amarelos, biconvexos, revestidos, medindo 9,5 mm de diâmetro.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

FUNED Donepezila deve ser administrado por via oral.

### **Adultos/Idosos**

FUNED Donepezila deve ser tomado por via oral, uma vez por dia. As doses clinicamente eficazes são 5 mg e 10 mg nos pacientes com doença leve a moderadamente grave. A dose de 10 mg é a dose clinicamente eficaz nos pacientes com doença moderadamente grave a grave. A dose inicial é de 5 mg/dia e pode ser aumentada para 10 mg/dia após 4 a 6 semanas. A dose diária máxima recomendada é de 10 mg.

### **Tratamento de manutenção**

O tratamento de manutenção pode ser mantido enquanto houver benefício terapêutico para o paciente.

Com a descontinuação do tratamento, observa-se diminuição gradativa dos efeitos benéficos de FUNED Donepezila. Não há evidências de efeito rebote ou de abstinência após a descontinuação repentina da terapia.

### **Comprometimento renal (dos rins) e hepático (do fígado)**

Os pacientes com insuficiência hepática (diminuição da função do fígado) leve a moderada ou insuficiência renal (diminuição da função dos rins) podem seguir um esquema posológico semelhante porque a depuração do cloridrato de donepezila não é significativamente alterada por essas condições.

### **Crianças**

Não existem estudos adequados e bem controlados para documentar a segurança e a eficácia de FUNED Donepezila em qualquer tipo da doença que ocorre em crianças.

FUNED Donepezila deve ser tomado à noite, logo antes de deitar.

FUNED Donepezila poderá ser tomado com ou sem alimentos.

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

**Este medicamento não pode ser partido, aberto ou mastigado.**

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Caso você se esqueça de tomar FUNED Donepezila no horário estabelecido, tome-o assim que lembrar. Entretanto, se já estiver perto do horário de tomar a próxima dose, pule a dose esquecida e tome a próxima. Neste caso, não tome o medicamento em dobro para compensar doses esquecidas. O esquecimento de dose pode comprometer a eficácia do tratamento.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?**

**Reação muito comum (ocorre em 10% dos pacientes que utilizam este medicamento):** diarreia, cefaleia (dor de cabeça), náusea e queda.

**Reação comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento):** dores, acidentes, fadiga, desmaios, vômitos, anorexia, câimbras, insônia, tontura, sonhos anormais, resfriado comum e distúrbios abdominais.

Foram observados casos de bradicardia (diminuição da frequência cardíaca), bloqueio sinoatrial (alteração do ritmo cardíaco), bloqueio atrioventricular (alteração do ritmo cardíaco) e diminuição da concentração sanguínea de potássio.

Existem relatos pós-comercialização de alucinações, agitação, convulsão, hepatite (inflamação do fígado), úlcera gástrica (ferida dentro do estômago), úlcera duodenal (ferida dentro do duodeno) e hemorragia gastrointestinal (sangramento no estômago e/ou intestino), rabdomiólise (destruição das células musculares) e síndrome neuroléptica maligna (contração muscular involuntária grave, febre alta, aceleração importante dos batimentos do coração, tremores generalizados).

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

## **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

No caso de ingestão, ou suspeita de ingestão, de uma grande quantidade de FUNED Donepezila, procure imediatamente um médico ou um serviço de saúde mais próximo.

**Sintomas da superdose:** a superdose com inibidores da colinesterase (classe terapêutica do FUNED Donepezila) pode resultar em crise colinérgica caracterizada por náusea grave, vômitos, salivação, sudorese, bradicardia (diminuição da frequência cardíaca), diminuição da pressão sanguínea, diminuição dos movimentos respiratórios, falência do organismo e convulsões. Existe a possibilidade de aumento da fraqueza muscular, que pode resultar em óbito se os músculos respiratórios forem envolvidos.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**III - DIZERES LEGAIS**

MS 1.1209.0137

Farmacêutica Responsável: Juliana Souki Diniz

CRF/MG N° 11.713



**Registrado por:**

Fundação Ezequiel Dias

Rua Conde Pereira Carneiro n° 80

Gameleira – Belo Horizonte/MG

CEP 30 510 – 010

CNPJ 17.503.475/0001-01

Indústria Brasileira

**Fabricado por:**

CRISTÁLIA Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.

Rodovia Itapira – Lindóia, Km 14

Bairro Ponte Preta - Itapira/SP

CEP 13 974 - 900

CNPJ 44.734.671/0001-51

Indústria Brasileira

SERVIÇO DE  
ATENDIMENTO  
AO CLIENTE  **0800 2831980**

**USO SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.**

**PROIBIDA A VENDA AO COMÉRCIO.**

**SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA.**

**Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela ANVISA em (19/10/2016).**

BULFJ-0059-REV02\_Paciente



### HISTÓRICO DE ALTERAÇÃO PARA A BULA

| Número do expediente | Nome do assunto   | Data da notificação/petição | Data de aprovação da petição | Itens alterados  | Versões | Apresentações relacionadas   |
|----------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--|---------|--|
| 2218457/16-1         | 10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | 25/08/2016                  | 25/08/2016                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusão inicial de texto de bula segundo RDC 60/2012, contemplando os itens mencionados na RDC 47/2009 e alterações feitas pelo medicamento referência – ERANZ<sup>®</sup>.</li> <li>DIZERES LEGAIS – Inclusão do número do registro e do nome do bairro e número do CEP da Unidade da CRISTÁLIA.</li> </ul> | VP      | 5 MG COM REV CT BL AL/AL X 28<br>5 MG COM REV CT BL AL/AL X 30<br>5 MG COM REV CT BL AL/AL X 200 (EMB HOSP)<br>5 MG COM REV CT BL AL/AL X 250 (EMB HOSP)<br>5 MG COM REV CT BL AL/AL X 500 (EMB HOSP)<br>5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28<br>5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30<br>5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 200 (EMB HOSP)<br>5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 250 (EMB HOSP)<br>5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 500 (EMB HOSP)<br>10 MG COM REV CT BL AL/AL X 28<br>10 MG COM REV CT BL AL/AL X 30<br>10 MG COM REV CT BL AL/AL X 200 (EMB HOSP)<br>10 MG COM REV CT BL AL/AL X 250 (EMB HOSP)<br>10 MG COM REV CT BL AL/AL X 500 (EMB HOSP)<br>10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28<br>10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30<br>10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 200 (EMB HOSP)<br>10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 250 (EMB HOSP)<br>10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 500 (EMB HOSP) |

FUNED Donepezila comprimido revestido de 5 mg e de 10 mg – Bula do Paciente

| Número do expediente | Nome do assunto  | Data da notificação/petição | Data de aprovação da petição | Itens alterados  | Versões | Apresentações relacionadas   |
|----------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--|---------|--|
|                      | 10450 - SIMILAR<br>– Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | 1º/11/2016                  | 1º/11/2016                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notificação de alteração de texto de bula para adequação à bula padrão do medicamento referência ERANZ aprovada em 19/10/2016 por esta Agência;</li> <li>• QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?</li> <li>• O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?</li> <li>• ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?</li> <li>• COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?</li> <li>• O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?</li> <li>• QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?</li> <li>• O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTOS?</li> </ul> | VP      | 5 MG COM REV CT BL AL/AL X 28<br>5 MG COM REV CT BL AL/AL X 30<br>5 MG COM REV CT BL AL/AL X 200 (EMB HOSP)<br>5 MG COM REV CT BL AL/AL X 250 (EMB HOSP)<br>5 MG COM REV CT BL AL/AL X 500 (EMB HOSP)<br>5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28<br>5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30<br>5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 200 (EMB HOSP)<br>5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 250 (EMB HOSP)<br>5 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 500 (EMB HOSP)<br>10 MG COM REV CT BL AL/AL X 28<br>10 MG COM REV CT BL AL/AL X 30<br>10 MG COM REV CT BL AL/AL X 200 (EMB HOSP)<br>10 MG COM REV CT BL AL/AL X 250 (EMB HOSP)<br>10 MG COM REV CT BL AL/AL X 500 (EMB HOSP)<br>10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28<br>10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30<br>10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 200 (EMB HOSP)<br>10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 250 (EMB HOSP)<br>10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 500 (EMB HOSP) |