

## Texto de Bula para o Paciente – Gripp Heel® – Sol. Injetável

GrippHeel®

Aconitum napellus D3 + ASSOCIAÇÃO

### MEDICAMENTO ANTI-HOMOTÓXICO

#### APRESENTAÇÃO

Solução injetável — Ampolas com 1,1 ml.

#### VIA PARENTERAL

#### USO ADULTO E PEDIÁTRICO

#### COMPOSIÇÃO

Cada ampola com 1,1 ml contém: 4,40 mg de Aconitum napellus D3 dil.; 2,20 mg de Bryonia cretica D3 dil.; 2,20 mg de Lachesis mutus D11 dil.; 1,10 mg de Eupatorium perfoliatum D2 dil. e 1,10 mg de Phosphorus D4 dil.. Excipientes: cloreto de sódio e água para injetável.

#### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

##### PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Gripp-Heel é auxiliar no tratamento das manifestações clínicas dos resfriados e da gripe.

**A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.**

##### COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

**As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.**

A aplicação do medicamento anti-homotóxico atende aos princípios da Homotoxicologia. Esta terapêutica considera as enfermidades como a expressão de uma resposta defensiva do organismo contra as toxinas produzidas pelo organismo, ou ingeridas, ou inaladas, ou o resultado de danos tóxicos que o organismo tenta compensar, com a finalidade de restabelecer dentro do possível o equilíbrio biológico. Este novo conceito de tratamento nasceu na terapêutica homeopática a qual está embasada no princípio da similitude, na lei de cura e na patogenia das substâncias medicamentosas descritas nas Matérias Médicas Homeopáticas, bem como, nos conceitos da imunologia.

##### QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é contraindicado às pessoas com alergia aos componentes da fórmula.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica, ou do cirurgião-dentista.**

**Durante a lactação não use este medicamento sem orientação do seu médico.**

##### O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso os sintomas se prolonguem, como falta de ar, expectoração supurativa, febre ou dor devida à respiração difícil, procure orientação do seu médico.

**Informe seu médico ou cirurgião-dentista sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

##### ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve guardar este medicamento, sempre na embalagem original, em local seco e à temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), longe de qualquer tipo de fonte de calor e, ou umidade.

## Texto de Bula para o Paciente – Gripp Heel® – Sol. Injetável

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido.

Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.

Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.

Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

A solução injetável de Gripp-Heel é incolor, límpida e inodora.

Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se você poderá utilizá-lo.


Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

### COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é de uso parenteral.


**Dose recomendada para adultos e crianças:** Em afecções agudas, diariamente 1 ampola por via parenteral, ou em casos não agudos, de 1 a 3 vezes por semana 1 ampola por via parenteral.

#### Como abrir a ampola:



#### Ponto colorido para cima!

Fazer o líquido eventualmente contido na parte superior da ampola passar para a parte inferior por meio de movimentos circulares ou pequenos golpes de dedo.



#### Ponto colorido para cima!

Segurando firmemente o corpo da ampola numa mão, aplicar com a outra uma força sobre a parte superior, em direção contrária ao ponto (ou seja, para baixo), até o rompimento do gargalo da ampola.

Mantenha sempre a dose e a frequência indicadas pelo prescritor.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Caso os sintomas persistam por mais de 2 dias ou se agravem, suspenda o uso do medicamento e entre em contato com o seu médico ou cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico ou cirurgião dentista o aparecimento de sintomas novos, agravação de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos, pois pode significar uma reação ao medicamento, que pode requerer uma nova orientação do prescritor.

O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.

Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.

Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em até 2 dias, consulte um profissional de saúde. No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.

## Texto de Bula para o Paciente – Gripp Heel® – Sol. Injetável

### **O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Caso você esqueça-se de tomar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

### **QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure seu médico, ou farmacêutico.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC).

### **O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

A conduta nos casos de ingestão acidental e, ou ingestão acima da dose sugerida, ou prescrita, é observar o surgimento de alguma manifestação clínica, tais como: tontura, enjoo, náuseas e dor de cabeça e, caso isto aconteça, suspenda o uso do medicamento e procure o seu médico, ou o farmacêutico.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

### **Venda sob prescrição médica.**

MS: 1.6198.0005.002-3

Farmacêutico responsável: Wilton Adão - CRF-PR nº 30.165

Fabricado por: Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532 – Baden-Baden, Alemanha.

Importado e distribuído por:

### **Heel do Brasil Biomédica Ltda.**

Avenida Santos Dumont, 1100 3º andar

83403-500 – Colombo – PR

CNPJ: 05.994.539/0001-27

SAC: 0800-7709000

www.heel.com.br

**- Heel**



Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 11/09/2019.